

NAVIGATE

Standaardisatie van Terminologie in Vaattoegang

Nomenclatuur voor eenduidige terminologie binnen de vaattoegang

Een beknopt naslagwerk voor de terminologie van vaattoegang bij pasgeborenen, kinderen en volwassenen.

BASISREGEL

Indeling op basis van de locatie van de kathetertip

Een CVAD (centraal veneuze katheter) heeft de kathetertip in de vena cava superior (SVC), het rechteratrium (RA) of de vena cava inferior (IVC). Een katheter die bedoeld is voor centrale positionering, maar waarvan de kathetertip buiten deze locaties ligt, wordt als perifeer beschouwd. Gebruik CVC niet als synoniem voor CICC. CVC is een algemene term voor een centraal veneuze katheter en beschrijft niet de inbrengroute.

Eenduidige terminologie

GEBRUIK EENDUIDIGE TERMEN

SPC • LPC • MC • PICC • CICC • FICC • TIVAD

Vermeld de inbrengroute, de locatie van de kathetertip en de tunnel-/cuffstatus.

VOORKOM DUBBELZINNIGHEID

Gebruik “CVC” niet voor CICC en “PIVC” niet voor SPC

“Port-a-cath™” is een merknaam; gebruik TIVAD (of port).

TERMINOLOGIE BIJ KINDEREN EN VOLWASSENEN

PVAD + CVAD

Perifeer Veneuze Katheters (PVADs)

Classificeer perifere veneuze katheters op basis van hun lengte. De term ‘midline’ is niet van toepassing op alle perifere katheters langer dan 6 cm.

SPC Korte perifere katheter Lengte < 6 cm Meestal ingebracht in de onderarm Gebruik PIVC niet als synoniem voor SPC: PIVC is een algemene term voor een perifeer veneuze katheter en verwijst niet naar één specifiek type katheter.	LPC Lange perifere katheter Ook: mini-midline / korte midline Lengte 6-15 cm Ingebracht in de onderarm of bovenarm; Oppervlakkige of diepe vene; directe of echogeleide punctie	MC Midline katheter Ook: midclaviculaire katheter Lengte >15 cm Echogeleide punctie van een diepe vene in de bovenarm Kathetertip in de vena axillaris of vena subclavia Kan getunneld worden ingebracht of subcutaan worden verankerd
---	--	--

Centrale Veneuze Katheters (CVADs)

Bij alle onderstaande centraal veneuze katheters bevindt de kathetertip zich in de SVC, RA of IVC. De benaming van de katheter wordt bepaald door de inbrengroute.

PICC Perifeer ingebrachte centrale veneuze katheter Echogeleide punctie van een diepe vene in de bovenarm: vena basilica, vena brachialis, brachiaal-axillaire traject of venacephalica.	CICC Centraal ingebrachte centrale veneuze katheter Echogeleide supraclaviculaire of infraclaviculaire punctie van de: vena jugularis interna, vena brachiocephalica, vena subclavia, diepe vena jugularis externa of thoracale vena cephalica/axillaris.	FICC Femoraal ingebrachte centrale veneuze katheter Echogeleide punctie van een vene in de lies/dijbeen: vena femoralis communis, vena femoralis superficialis of vena saphena
TIVAD - PK Volledig implanteerbaar veneus toegangssysteem (port) Brachiale poortkatheters (PICC poortkatheter); thoracale poortkatheters (CICC poortkatheter); or femorale poortkatheters (FICC poortkatheter).	TUNNELLING Van toepassing op CICC, PICC en FICC Tc = getunneld, met cuff Tnc = getunneld, zonder cuff	VOLLEDIGE BESCHRIJVING Vermeld: kathetertype + aantal French + aantal lumina + materiaal + lengte + geschiktheid voor hogedrukinjectie + specifieke toepassing.

ARTERIËLE KATHETERS

ALLE LEEFTIJDSGROEPEN

IAC Intra-arteriële katheter Vermeld de arterie waarin de katheter is ingebracht: arteria femoralis, arteria radialis, arteria umbilicalis, arteria dorsalis pedis, arteria tibialis posterior of arteria ulnaris. Pulmonaliskatheters (PAC) worden afzonderlijk geclassificeerd.

NOMENCLATUUR VOOR PASGEBORENEN

SPECIFIEKE NEONATALE CLASSIFICATIE

Voor pasgeborenen gelden andere classificatiecriteria dan voor kinderen en volwassenen. Een n-PICC/ECC is niet hetzelfde type katheter als een PICC bij kinderen en volwassenen.

NEONATALE PVAD n-SPC Korte perifere katheter voor pasgeborenen: Lengte <2 cm n-LPC Lange perifere katheter voor pasgeborenen: Lengte 2-6 cm Kathetertip in een vene van de arm of het been	NEONATALE CVAD UVC Umbilicale veneuze katheter. Kathetertip ter hoogte van de IVC-RA-overgang. ECC / n-PICC Neonatale PICC / epicutaneo-cava-katheter SVC-route: kathetertip in het onderste deel van de SVC, ter hoogte van de SVC-RA-overgang of in het bovenste deel van het RA. IVC-route: kathetertip in de subdiafragmatische IVC of ter hoogte van de IVC-RA-overgang. CICC Echogeleide punctie van een diepe vene boven de clavicula, voornamelijk de vena jugularis interna (IJV) of vena brachiocephalica (BCV). Kathetertip ter hoogte van de SVC-RA-overgang of in het bovenste deel van het RA. FICC Echogeleide punctie van de vena femoralis communis. Kathetertip in de subdiafragmatische IVC of ter hoogte van de IVC-RA-overgang. De aanduidingen Tc/Tnc zijn van toepassing op CICC en FICC.
--	---