



Un langage commun pour les dispositifs d'accès vasculaire

Nomenclature via les avancées mondiales intégrées dans l'efficacité terminologique
Une référence concise pour la nomenclature des accès vasculaires néonataux, pédiatriques et adultes

RÈGLE FONDAMENTALE

Classer selon la position de l'extrémité du cathéter

CVAD (dispositif d'accès veineux central) = extrémité dans la veine cave supérieure (SVC), l'oreillette droite (RA) ou la veine cave inférieure (IVC).
Un dispositif destiné à être central mais dont l'extrémité se trouve en dehors de ces vaisseaux est classé comme périphérique. « CVC » ne doit pas être utilisé comme synonyme de CICC: c'est un synonyme générique de CVAD.

Le changement de langue

UTILISEZ DES TERMES PRÉCIS

SPC • LPC • MC • PICC • CICC • FICC • TIVAD
Spécifiez la voie d'accès, l'emplacement de l'extrémité et la tunnelisation / manchon.

ÉVITEZ L'AMBIGUÏTÉ

« CVC » pour CICC • « PIVC » pour SPC
« Port-a-cath™ » est une marque déposée; utilisez TIVAD (ou port).

NOMENCLATURE PÉDIATRIQUE + ADULTE

PVAD + CVAD

Dispositifs d'accès veineux périphériques (PVAD)

Classez les dispositifs périphériques selon leur longueur. « Midline » n'est pas un terme générique pour chaque cathéter périphérique de plus de 6 cm.

SPC Cathéter périphérique court Longueur <6 cm Généralement inséré dans l'avant-bras N'utilisez pas PIVC lorsque vous voulez dire SPC: PIVC est un synonyme de PVAD, ce n'est pas un autre dispositif.	LPC Cathéter périphérique long Aussi: mini-midline / short midline Longueur 6-15 cm Avant-bras ou bras; extrémité placée dans les veines de l'avant-bras ou du bras supérieur Veines superficielles / profondes; ponction directe ou guidée par échographie.	MC Cathéter Midline Aussi: cathéter médio-claviculaire Longueur >15 cm Veine profonde du bras supérieur; guidée par échographie Extrémité placée dans la veine axillaire ou sous-clavière Peut être tunnelisé / ancré sous-cutanément.
---	---	--

Dispositifs d'accès veineux centraux (CVAD)

Tous les cathéters centraux ci-dessous nécessitent une extrémité dans la SVC, RA ou la IVC. Les définitions d'insertion distinguent les noms des dispositifs.

PICC Cathéter central inséré par voie périphérique Veine profonde du bras guidée par échographie: basilique, brachial, trajet brachial axillaire, ou veine céphalique dans le bras. TIVAD Dispositif d'accès veineux totalement implantable (port) PICC-port brachial (port dans le bras) / CICC-port thoracique ou FICC-port fémoral.	CICC Cathéter central inséré par voie centrale Veine supra- ou infra-claviculaire guidée par échographie: jugulaire interne, brachiocéphalique, sous-clavière, jugulaire externe profonde, céphalique thoracique/axillaire. LA TUNNELISATION S'applique à tout CICC, PICC ou FICC Tc = tunnelisé, à manchon Tnc = tunnelé, sans manchon	FICC Cathéter central inséré par voie fémorale Veine du membre inférieur guidée par échographie: fémoral commun, fémoral superficiel, ou veine saphène. ÉCRIVEZ-LE ENTIÈREMENT dispositif + calibre + lumens + matériau + longueur + injectabilité + usage spécial.
---	---	--

DISPOSITIFS D'ACCÈS ARTÉRIEL

TOUTES LES POPULATIONS

IAC Cathéter intra-artériel Nommez-le selon l'artère canulée: fémorale, radiale, ombilicale, dorsale du pied, tibiale postérieure ou ulnaire. Les cathéters de l'artère pulmonaire (PAC) sont considérés séparément.

NOMENCLATURE NÉONATALE

CLASSIFICATION DISTINCTE

Les catégories néonatales ne peuvent pas simplement hériter des seuils pédiatriques/adultes. L'ECC/n-PICC n'est pas le même dispositif que le PICC utilisé chez les enfants/adultes.

PVAD NÉONATAL n-SPC Cathéter périphérique court néonatal: longueur standard <2 cm n-LPC Cathéter périphérique long néonatal: 2-6 cm Extrémité située dans les veines du bras ou de la jambe. POURQUOI L'ECC N'EST PAS LE PICC POUR ADULTES/ENFANTS ECC/n-PICC: 1-2,7 Fr; ponction directe des veines superficielles visibles du membre ou du cuir chevelu; durée typique de 1 à 2 semaines. PICC (enfant/adulte): 3-6 Fr; accès veineux du bras guidé par échographie; injectable sous pression; durée typique en mois.	CVAD NÉONATAL UVC Cathéter veineux ombilical: extrémité à la jonction IVC-RA ECC / n-PICC Cathéter épicutanéocave / PICC néonatal Trajet de la SVC: SVC inférieur, jonction SVC-RA ou RA supérieur. Voie de la IVC: IVC sous-diaphragmatique ou jonction IVC-RA. CICC Veine profonde supra-claviculaire guidée par échographie (principalement IJV/BCV) extrémité à la jonction SVC-RA ou dans la partie supérieure de l'oreillette droite. FICC Veine fémorale commune guidée par échographie; extrémité sous-diaphragmatique IVC ou à la jonction IVC-RA. Les préfixes Tc/Tnc s'appliquent aux CICC/FICC.
---	--