

NAVIGATE

Wspólny język dla urządzeń dostępu naczyniowego

Nomenklatura poprzez zintegrowane globalne postępy w efektywności terminologii

Związły przewodnik po nazewnictwie dostępu naczyniowego noworodków, dzieci i dorosłych

ZASADA PODSTAWOWA

Klasyfikuj według lokalizacji końcówki cewnika

CVAD (centralny cewnik żylny) = końcówka w żyły głównej górnej (SVC), prawym przedsionku (RA) lub żyły głównej dolnej (IVC).

Urządzenie przeznaczone do umieszczenia centralnego, ale z końcówką poza tymi naczyniami, jest klasyfikowane jako obwodowe. „CVC” nie powinno być używane jako synonim CICC: jest to ogólny synonim CVAD.

Zmiana języka

UŻYWAJ PRECYZYJNYCH TERMINÓW

SPC • LPC • MC • PICC • CICC • FICC • TIVAD

Określ trasę dostępu, lokalizację końcówki oraz stan tunelu/mankietu.

UNIKAJ DWUZNACZNOŚCI

„CVC” dla CICC • „PIVC” dla SPC

„Port-a-cath™” to nazwa handlowa; używaj TIVAD (lub port).

NAZEWNICTWO PEDIATRYCZNE I DOROSŁYCH

PVAD + CVAD

Urządzenia do dostępu żylnego obwodowego (PVAD)

Klasyfikuj urządzenia peryferyjne według długości. „Midline” nie jest określeniem zbiorczym dla każdego cewnika obwodowego dłuższego niż 6 cm.

SPC

Krótki cewnik obwodowy

Długość <6 cm

Zazwyczaj wprowadzany w przedramię

Nie używaj PIVC, gdy masz na myśli SPC:
PIVC to synonim PVAD, a nie jedno urządzenie.

LPC

Długi cewnik obwodowy

Również: mini-środkowa linia / krótka środkowa linia

Długość 6-15 cm

Przedramię lub ramię; końcówka w żyłach przedramienia lub ramienia

Żyły powierzchowne/głębokie; nakłucie bezpośrednie lub pod kontrolą USG.

MC

Cewnik śródżylny

Również: cewnik środkowo-obojczykowy

Długość >15 cm

Głęboka żyła ramienia; prowadzona pod kontrolą USG
Zakrzep w żyłę pachowej lub podobojczykowej

Może być tunelowany / zakotwiczony podskórnie.

Centralne urządzenia dostępu żylnego (CVAD)

Wszystkie poniższe cewniki centralne wymagają umieszczenia końcówki w SVC, RA lub IVC. Definicje wprowadzenia rozróżniają nazwy urządzeń.

PICC

Cewnik centralny wprowadzany obwodowo

Żyła głęboka ramienia prowadzona przez USG:
żyła odłokciowa, ramienna, pęczek ramiennie-pachowy,
lub żyła odpromieniowa w ramieniu.

TIVAD

Całkowicie implantowalne urządzenie do dostępu żylnego (port)

Port ramienny/PICC (port na ramieniu); port piersiowy/CICC;
lub port udowy/FICC.

CICC

Cewnik centralny zakładany centralnie

Żyła nadobojczykowa lub podobojczykowa prowadzona pod kontrolą USG:

żyła szyjna wewnętrzna, ramiennie-głowowa, podobojczykowa,
głęboka zewnętrzna żyła szyjna, piersiowa cefaliczna/pachowa.

STATUS TUNELU

Dotyczy każdego CICC, PICC lub FICC

Tc = tunelowany, z mankietem
Tnc = tunelowany, bez mankietu

FICC

Cewnik centralny wprowadzony przez tętnicę udową

Żyła kończyny dolnej prowadzona ultrasonograficznie:

wspólna udowa, powierzchowna udowa,
lub żyła odstrzałkowa.

NAPISZ TO W PEŁNI

urządzenie + kaliber + lumeny + materiał + długość +
zdolność do wstrzykiwania + specjalne przeznaczenie.

URZĄDZENIA DOSTĘPU TĘTNICZEGO

WSZYSTKIE POPULACJE

IAC

Cewnik dotętniczny

Nazwij ją według kaniulowanej tętnicy: udowa, promieniowa, pępkowa, grzbietowa stopy, tylna piszczelowa lub łokciowa.
Cewniki tętnicy płucnej (PAC) są rozpatrywane oddzielnie.

NAZEWNICTWO NEONATALNE

WYRAŻNA KLASYFIKACJA

Kategorie noworodkowe nie mogą po prostu dziedziczyć progów pediatrycznych/dorosłych. ECC/n-PICC to nie to samo urządzenie co PICC używany u dzieci/dorosłych.

NEONATALNY PVAD

n-SPC

Neonatalny krótki cewnik obwodowy: standardowa długość <2 cm

n-LPC

Długi cewnik obwodowy noworodkowy: 2-6 cm
Kończówka umieszczona w żyłach ramienia lub nogi.

DLACZEGO ECC NIE JEST DOROSŁYM/ DZIECIĘCYM PICC

ECC/n-PICC: 1-2,7 Fr; bezpośrednie nakłucie widocznych powierzchownych żył kończyn/skalp; typowy czas trwania 1-2 tygodnie.

PICC (dziecko/dorosły): 3-6 Fr; dostęp do żyły ramienia prowadzony pod kontrolą USG; możliwość podawania ciśnieniowego; typowy czas trwania: miesiące.

NEONATALNY CVAD

UVC

Cewnik żyły pępkowej: końcówka na złączu żyły głównej dolnej i prawego przedsionka

ECC / n-PICC

Cewnik epikutaniczno-żylniowy / noworodkowy PICC

Droga SVC: dolna SVC, złącze SVC-RA lub górna RA.

Droga żyły głównej dolnej (IVC): podprzeponowa żyła główna dolna lub połączenie żyły głównej dolnej z prawym przedsionkiem (IVC-RA).

CICC

Nadobojczykowa żyła głęboka prowadzona pod kontrolą USG (głównie IJV/BCV); koniec w miejscu połączenia SVC-RA lub w górnej części RA.

FICC

Żyła udowa wspólna prowadzona pod kontrolą USG; końcówka w podprzeponowej
Ż. główna dolna lub na złączu ż. głównej dolnej z prawym przedsionkiem.
Prefiksy Tc/Tnc dotyczą CICC/FICC.