

NAVIGATE

Uma linguagem comum para dispositivos de acesso vascular

Nomenclatura por Meio de Avanços Globais Integrados em Eficiências Terminológicas

Uma referência concisa para a nomenclatura de acesso vascular neonatal, pediátrico e adulto

REGRA FUNDAMENTAL

Classifique pela localização da ponta do cateter

CVAD (dispositivo de acesso venoso central) = ponta na veia cava superior (SVC), átrio direito (RA) ou veia cava inferior (IVC).

Um dispositivo destinado a ser central, mas com a ponta fora desses vasos, é classificado como periférico. “CVC” não deve ser usado como sinônimo de CICC: é um sinônimo genérico para CVAD.

A mudança de idioma

USE TERMOS PRECISOS

SPC • LPC • MC • PICC • CICC • FICC • TIVAD

Especifique a rota de acesso, a localização da ponta e o status do túnel/braçadeira.

EVITE AMBIGUIDADE

“CVC” para CICC • “PIVC” para SPC

“Port-a-cath™” é uma marca registrada; use TIVAD (ou porta).

NOMENCLATURA PEDIÁTRICA + ADULTA

PVAD + CVAD

Dispositivos de acesso venoso periférico (DAVE)

Classifique os dispositivos periféricos pelo comprimento. “Midline” não é um termo genérico para todo cateter periférico com mais de 6 cm.

SPC Cateter periférico curto Comprimento <6 cm Normalmente inserido no antebraço Não use PIVC quando quiser dizer SPC: PIVC é um sinônimo para PVAD, não um dispositivo único.	LPC Cateter periférico longo Também: mini-linha média / linha média curta Comprimento 6-15 cm Antebraço ou braço; ponta nas veias do antebraço ou do braço superior Veias superficiais/profundas; punção direta ou guiada por ultrassom.	MC Cateter de linha média Também: cateter midclavicular Comprimento >15 cm Veia profunda do braço superior; guiada por ultrassom Ponta na veia axilar ou subclávia Pode ser tunelizado / ancorado subcutaneamente.
--	--	--

Dispositivos de acesso venoso central (DAVCs)

Todos os cateteres centrais abaixo exigem uma ponta na SVC, RA ou IVC. As definições de inserção distinguem os nomes dos dispositivos.

PICC Cateter central inserido perifericamente Veia profunda do braço guiada por ultrassom: basílico, braquial, trato braquial axilar, ou veia cefálica no braço. TIVAD Dispositivo de acesso venoso totalmente implantável (porta) Porta braquial/PICC (porta no braço); porta torácica/CICC; ou femoral/porta FICC.	CICC Cateter central de inserção central Veia supra- ou infra-clavicular guiada por ultrassom: jugular interna, braquiocefálica, subclávia, jugular externa profunda, cefálica torácica/axilar. STATUS DO TÚNEL Aplicar a qualquer CICC, PICC ou FICC Tc = tunelizado, com manguito Tnc = tunelizado, sem manguito	FICC Cateter central inserido femoralmente Veia do membro inferior guiada por ultrassom: femoral comum, femoral superficial, ou veia safena. ESCREVA COMPLETAMENTE dispositivo + calibre + lumens + material + comprimento + injetabilidade + propósito especial.
--	--	---

DISPOSITIVOS DE ACESSO ARTERIAL

TODAS AS POPULAÇÕES

IAC Cateter intra-arterial Nomeie pela artéria canulada: femoral, radial, umbilical, dorsal do pé, tibial posterior ou artéria ulnar. Cateteres da artéria pulmonar (PAC) são considerados separadamente.
--

NOMENCLATURA NEONATAL

CLASSIFICAÇÃO DISTINTA

As categorias neonatais não podem simplesmente herdar os limites pediátricos/adultos. ECC/n-PICC não é o mesmo dispositivo que o PICC usado em crianças/adultos.

PVAD NEONATAL n-SPC Cateter periférico curto neonatal: comprimento padrão <2 cm n-LPC Cateter periférico longo neonatal: 2-6 cm Ponta localizada nas veias do braço ou da perna. POR QUE O ECC NÃO É O PICC ADULTO/INFANTIL ECC/n-PICC: 1-2,7 Fr; punção direta de veias superficiais visíveis dos membros/couro cabeludo; duração típica de 1-2 semanas. PICC (child/adult): 3-6 Fr; US-guided arm-vein access; power injectable; typical duration months.	CVAD NEONATAL UVC Cateter venoso umbilical: ponta na junção IVC-RA ECC / n-PICC Cateter epicutâneo-cava / PICC neonatal Rota da SVC: SVC inferior, junção SVC-RA ou RA superior. Via da IVC: IVC subdiafragmática ou junção IVC-RA. CICC Veia profunda supra-clavicular guiada por ultrassom (principalmente IJV/BCV) ponta na junção SVC-RA ou na parte superior do RA. FICC Veia femoral comum guiada por ultrassom; ponta subdiafragmática Veia cava inferior (IVC) ou na junção IVC-RA. Prefixos Tc/Tnc aplicam-se a CICC/FICC.
---	---