

NAVIGATE

Un lenguaje común para dispositivos de acceso vascular

Nomenclatura a través de Avances Globales Integrados en Eficiencias Terminológicas

Una guía concisa sobre la terminología del acceso vascular en pacientes neonatos, pediátricos y adultos

REGLA FUNDAMENTAL

Clasificar según la ubicación de la punta del catéter

CVAD (dispositivo de acceso venoso central) = punta en la vena cava superior (SVC), aurícula derecha (RA) o vena cava inferior (IVC).
Todas las siglas utilizadas en el texto corresponden a los términos de referencia en inglés; por ejemplo, la vena cava superior se abrevia como SVC (Superior Vena Cava), etc.
Un dispositivo destinado a ser central pero con la punta fuera de esos vasos se clasifica como periférico. “CVC” no debe usarse como sinónimo de CICC: es un sinónimo genérico de CVAD.

El cambio de idioma

UTILICE TÉRMINOS PRECISOS

SPC • LPC • MC • PICC • CICC • FICC • TIVAD

Especifique la ruta de acceso, la ubicación de la punta y el estado del túnel/manguito.

EVITE LA AMBIGÜEDAD

“CVC” para CICC • “PIVC” para SPC

“Port-a-cath™” es un nombre de marca; use TIVAD (o port, o reservorio).

NOMENCLATURA PEDIÁTRICA + ADULTA

PVAD + CVAD

Dispositivos de acceso venoso periférico (PVADs)

Clasifique los dispositivos periféricos por longitud. “Midline” no es un término genérico para todo catéter periférico que supere los 6 cm.

SPC

Catéter periférico corto

Longitud <6 cm

Generalmente insertado en el antebrazo

No utilice PIVC cuando se refiera a SPC.
PIVC es un sinónimo de PVAD, no se trata de un dispositivo concreto.

LPC

Catéter periférico largo

También: mini midline / línea media corta

Longitud 6-15 cm

Antebrazo o brazo; punta en venas antebrazo o del brazo superior

Venas superficiales/profundas; punción directa o guiada por ecografía.

MC

Catéter de línea media

También: catéter o medio-clavicular

Longitud >15 cm

Vena profunda del brazo superior; guiada por ultrasonido

Punta en la vena axilar o subclavia

Puede ser tunelizado / anclado subcutáneamente.

Central venous access devices (CVADs)

Todos los catéteres centrales que se indican a continuación requieren que la punta se sitúe en la SVC, la RA o la IVC. Las definiciones de inserción distinguen los nombres de los dispositivos.

PICC

Catéter central de inserción periférica

Vena del brazo profunda guiada por ecografía: vena basilíca, braquial, tracto braquioaxilar, o la vena cefálica del brazo.

TIVAD

Dispositivo de acceso venoso (puerto) totalmente implantable

PICC-Port braquial (en el brazo); puerto torácico/CICC; o FICC-Port (femoral).

CICC

Catéter central de inserción central

Vena supra- o infraclavicular guiada por ecografía: yugular interna, braquiocefálica, subclavia, yugular externa profunda, cefálica torácica/axilar.

ESTADO DEL TÚNEL

Aplicable a cualquier tip de CICC, PICC o FICC

Tc = con túnel, con manguito
Tnc = con túnel, sin manguito

FICC

Catéter central de inserción femoral

Venas de las extremidades inferiores guiadas por ecografía: femoral común, femoral superficial, o la vena safena.

ESCRIBALO AL COMPLETO

dispositivo + calibre + lúmenes + material + longitud + presión de inyección + finalidad específica.

DISPOSITIVOS DE ACCESO ARTERIAL

TODAS LAS POBLACIONES

IAC

Catéter intraarterial

Nómbrelo según la arteria en la que se realiza la canalización: femoral, radial, umbilical, dorsal del pie, tibial posterior o cubital.
Los catéteres de la arteria pulmonar (CAP) se tratan por separado.

NOMENCLATURA NEONATAL

CLASIFICACIÓN DISTINTA

Las categorías neonatales no pueden simplemente adoptar los puntos de corte pediátricos o de adultos. El ECC/n-PICC no es el mismo dispositivo que el PICC utilizado en niños o adultos.

PVAD NEONATAL

n-SPC Catéter periférico corto para recién nacidos: longitud estándar <2 cm

n-LPC Catéter periférico largo para recién nacidos: 2-6 cm
Punta del catéter situada en las venas del brazo o la pierna.

POR QUÉ EL ECC NO ES EL PICC MISMO QUE EL PICC EN ADULTOS Y PEDRIÁTICO

ECC/n-PICC: 1-2.7 Fr; punción directa de las venas superficiales visibles de las extremidades o del cuero cabelludo; duración habitual: 1-2 semanas.

PICC (niños/adultos): 3-6 Fr; acceso venoso en el brazo guiado por ecografía;apto para inyección a presión; duración habitual: meses.

CVAD NEONATAL

UVC Catéter venoso umbilical: punta situada en la unión entre la IVC y RA

ECC / n-PICC Catéter epicutáneo-cava / PICC neonatal
A través de SVC: parte inferior de la SVC, unión entre la SVC y RA o parte superior de la RA.
A través de IVC: subdiafragmática o unión IVC-RA.

CICC Vena profunda supraclavicular guiada por ecografía (principalmente la vena yugular interna (IJV) o braquiocefálica (BCV); punta en el la unión entre SVC-RA o en la parte superior de RA.

FICC Vena femoral común guiada por ecografía; punta en la región subdiaphragmática
IVC o en la unión entre laen la unión entre IVC y RA. Los prefijos Tc/Tnc se aplican a CICC/FICC.