



Спільна термінологія у сфері судинного доступу

Номенклатура створена завдяки інтегрованим глобальним досягненням в ефективності термінології

Короткий довідник з номенклатури, що стосується судинного доступу в новонароджених, дітей і дорослих

ОСНОВНЕ ПРАВИЛО

Класифікація за місцем розташування кінчика катетера

CVAD* (катетери для центрального венозного доступу) = кінчик у верхній порожнистій вені (SVC), правому передсерді (RA) або нижній порожнистій вені (IVC).

Якщо катетер має бути центральним, але його кінчик не знаходиться в перерахованих вище структурах, то він вважається периферичним. Термін «CVC» не слід використовувати як синонім до CICC, оскільки «CVC» є загальним синонімом для CVAD.

* Усі аббревіатури, використані в тексті, відповідають термінам англійською мовою; наприклад, верхня порожниста вена позначається як SVC (Superior Vena Cava) тощо.

Зміна термінології

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТОЧНІ ТЕРМІНИ

SPC • LPC • MC • PICC • CICC • FICC • TIVAD

Вказуйте шлях доступу, розташування кінчика та наявність тунелювання/манжетки.

УНИКАЙТЕ НЕОДНОЗНАЧНОСТІ

“CVC” for CICC • “PVC” for SPC

“Port-a-cath™” – це торгова назва; використовуйте термін TIVAD (або порт).

НОМЕНКЛАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ

PVAD + CVAD

Катетери для периферичного венозного доступу (PVADs)

Класифікуйте периферичні катетери за довжиною. «Midline» не є узагальнюючим терміном для будь-якого периферичного катетера довжиною понад 6 см.

SPC

Короткий периферичний катетер

Довжина <6 см

Зазвичай встановлюється у передпліччя

Не використовуйте термін PIVC, коли маєте на увазі SPC: PIVC є синонімом до терміну PVAD, а не назвою окремого катетера.

LPC

Довгий периферичний катетер

Інші назви: міні-midline / короткий midline

Довжина 6-15 см

Передпліччя або плече; кінчик у венах передпліччя або плеча

Поверхневі/глибокі вени; пункція звичайна або під контролем УЗ.

MC

Катетер Midline

Інша назва: середньоключичний катетер

Довжина >15 см

Глибокі вени верхньої частини плеча; під контролем УЗ

Кінчик у паховій або підключичній вені

Може бути тунельованим / фіксованим підшкірно.

Катетери для центрального венозного доступу (CVADs)

Для всіх наведених нижче центральних катетерів кінчик має бути в SVC, RA або IVC. Назви катетерів відрізняються залежно від місця встановлення

PICC

Периферично встановлений центральний катетер

Глибокі вени руки під контролем УЗ:

основна, плечова або головна вена, руки, плечо-пахвовий тракт.

TIVAD

Повністю імплантований девайс для судинного доступу (порт)

Плечовий/PICC-порт (порт на руці); грудний/CICC-порт; або стеговий/FICC-порт.

CICC

Центрально встановлений центральний катетер

Над- або підключична вена під контролем УЗ

внутрішня яремна, плечоголова, підключична, глибока зовнішня яремна, грудний відділ головної вени / пахвова вена

ТУНЕЛЬОВАНИЙ КАТЕТЕР?

Зазначається для будь-якого CICC, PICC або FICC

Tс = тунельований, з манжеткою

Tпс = тунельований, без манжетки

FICC

Стегновий центральний венозний катетер

Вени нижньої кінцівки під контролем УЗ:

загальна стегова, поверхнева стегова або велика підшкірна вена

ПИШІТЬ ПОВНІСТЮ

катетер + калібр + кількість просвітів + матеріал + довжина + придатність для ін'єкцій під тиском + спеціальне призначення.

АРТЕРІАЛЬНІ КАТЕТЕРИ

УСІ ПАЦІЄНТИ

IAC

Внутрішньоартеріальний катетер

Називайте його за артерією, що катетеризується: стегова, променева, пупкова, тильна артерія стопи, задня великогомілкова або ліктьова артерія.

Катетери легеневої артерії (PAC) розглядаються окремо.

НОМЕНКЛАТУРА ДЛЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ

ОКРЕМА КЛАСИФІКАЦІЯ

Назви катетерів для новонароджених не можуть просто успадкувати терміни, що використовуються в дітей/дорослих. ECC/n-PICC – це не такий самий PICC, який використовується в дітей/дорослих.

PVAD ДЛЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ

n-SPC

Неонатальний короткий периферичний катетер: стандартна довжина <2 см

n-LPC

Неонатальний довгий периферичний катетер: 2-6 см
Кінчик розташований у венах руки або ноги.

ЧОМУ НЕОНАТАЛЬНИЙ ECC ≠ ДОРОСЛИЙ/ДИТЯЧИЙ PICC

ECC/n-PICC: 1-2,7 Fr; пряма пункція видимих поверхневих вен кінцівок/шкіри голови; типова тривалість використання – 1-2 тижні.

PICC (діти/дорослі): 3-6 Fr; 3-6 Fr; доступ через вену руки під контролем УЗ; придатний для ін'єкцій під тиском; типова тривалість використання – місяці.

CVAD ДЛЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ

UVC

Пупковий венозний катетер: кінчик у місці з'єднання IVC-RA

ECC / n-PICC

Епікутанео-кавальний катетер / неонатальний PICC

Шлях через SVC: нижня частина SVC, з'єднання SVC-RA або верхня частина RA.

Шлях через IVC: піддіафрагмальна частина IVC або з'єднання IVC-RA.

CICC

Надключична глибока вена (зазвичай IJV/BCV), під контролем УЗ; кінчик на рівні з'єднання SVC-RA або у верхній частині RA.

FICC

Загальна стегова вена під контролем УЗ; кінчик у піддіафрагмальній частині IVC або на рівні з'єднання IVC-RA. До катетерів CICC/FICC також застосовуються префікси Tс/Tпс.